

NORIT®

Samenstelling

Norit bevat per tablet 125 mg geactiveerde kool als werkzaam bestanddeel. Het geneesmiddel bevat sacharose, lactose, natriumcarboxymethylcellulose en magnesiumstearaat als hulpstoffen.

Verpakking

Norit-tabletten zijn verpakt in potjes van 50 of 180 tabletten.

Werking

Norit bevat geactiveerde kool van plantaardige herkomst, hetgeen door haar grote inwendige oppervlak in het maag-darmkanaal aanwezige schadelijke of ongewenste stoffen kan adsorberen.

Leverancier

Norit N.V. (Amersfoort) is registratiehouder.

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder RVG 02043.

Voor inlichtingen en correspondentie:

VEMEDIA B.V., Diemen.

Vemedia informatielijn: 0900 2333666
(€ 0,15 p/min)

Toepassing

Norit wordt gebruikt ter aanvulling van dieetmaatregelen bij acute diarree.

Gevallen waarin Norit niet moet worden gebruikt

Ernstige verstopping van het maag-darmkanaal of verdenking daarvan, plotselinge buikpijn en met zweervorming gepaard gaande ontsteking van de dikke darm.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Het gebruik van Norit zal in het algemeen

de werking van oraal ingenomen geneesmiddelen verminderen. Gelijktijdig gebruik van Norit en orale contraceptiva ('de pil') kan mogelijk de werkzaamheid van de orale contraceptiva verminderen. Een aanvullende methode van anticonceptie (b.v. gebruik van een condoom) is in voorkomend geval noodzakelijk.

Speciale waarschuwingen

Indien de klachten na 3 dagen behandeling nog aanhouden, neem dan contact op met uw (huis-)arts. Door gebruik van de tabletten kan de ontlasting zwart kleuren.

Norit kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of het kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Gebruik van de tabletten heeft geen nadelige gevolgen voor de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Dosering en wijze van gebruik

6-9 tabletten per keer innemen en maximaal 27 tabletten per dag.

Verspreid het innemen zo gelijkmatig mogelijk over de dag.

De tabletten met water innemen.

Bijwerking(en)

Verstopping kan optreden. Indien een bijwerking optreedt die niet vermeld staat in deze bijsluiter, neem dan contact op met uw (huis-)arts of apotheek.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn

De tabletten dienen bij een temperatuur van 15-30°C en buiten bereik van kinderen bewaard te worden.

De uiterste gebruikstermijn van de tabletten is aangegeven op de onderkant van de verpakking.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2000.