

# WITTE KRUIS® POEDERS

739900-4

*U heeft Witte Kruis gekocht. Dit is een middel dat koortsverlagend en pijnstillend werkt. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het gebruik van Witte Kruis, poeder in sachets. Leest u de bijsluiter goed, ook als u het middel al langer gebruikt; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die manier blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.*

## **Wat is de samenstelling van Witte Kruis?**

Witte Kruis, poeder in sachets bevat per sachet 500 mg paracetamol en 50 mg coffeine.

Hulpstoffen: polyvidon, lactose, natriumstearylumaraat, siliciumdioxide.

## **Hoe is Witte Kruis verpakt?**

Witte Kruis, poeder in sachets is verpakt in een doos met 20 sachets.

## **Wat doet Witte Kruis?**

Witte Kruis, poeder in sachets werkt koortsverlagend en pijnstillend.

## **Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen?**

Vemedica Manufacturing BV

Postbus 171

1110 BC Diemen

## **VEMEDIA**

Witte Kruis, poeder in sachets is in het register ingeschreven onder RVG 13948

## **Wanneer wordt Witte Kruis gebruikt?**

Bij hoofdpijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

## **Wanneer mag u Witte Kruis niet gebruiken?**

Bij overgevoeligheid voor paracetamol/coffeïne of voor overige bestanddelen van het middel.

## **Waar moet u verder op letten voordat u Witte Kruis gebruikt?**

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen. Bij chronisch alcoholmisbruik dienen niet meer dan 4 sachets per dag te worden ingenomen.

## **Mag u Witte Kruis gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?**

Gebruik tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding uitsluitend na overleg met uw arts.

### **Beïnvloedt Witte Kruis het reactie- en concentratievermogen?**

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

### **Kan Witte Kruis met andere (genees)middelen worden gebruikt?**

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt. Breng uw arts of apotheker daarom altijd op de hoogte van de andere geneesmiddelen die u gebruikt. Bij chronisch alcoholgebruik of gebruik van stoffen die leverenzymen beïnvloeden zoals bepaalde slaapmiddelen (barbituraten) kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen.

Bij gelijktijdig langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (bepaald middel tegen infecties) neemt de kans op een tekort aan witte bloedlichaampjes toe. In het geval van twijfel, raadpleeg uw arts.

### **Hoe moet u Witte Kruis innemen en welke dosering moet u nemen?**

Strooi het poeder in een glas water, goed roeren en opdrinken.

Neem 1 sachet per keer, maximaal 6 sachets per etmaal. Het doseringsinterval moet minimaal 4 uur bedragen.

### **Wat moet u doen als u een dosering vergeten bent?**

Neem nooit een dubbele dosis van Witte Kruis om zo de vergeten dosis in te halen

### **Wat moet u doen bij een overdosering ?**

In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen. Verschijnselen van overdosering zijn gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

### **Welke bijwerkingen kunnen optreden?**

Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties (bijwerkingen) veroorzaken. In de aangegeven dosering treden weinig bijwerkingen op. Overgevoelighedsreacties zoals huiduitslag, galbulten en koorts komen in een enkel geval voor. Zelden kunnen afwijkingen in het bloed (bloedarmoede, bloeduitstortingen) voorkomen. Zeer zelden kan na langdurig gebruik een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose). Enkele gevallen van ontstekingen van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) en nierfalen (tubulaire necrose) na langdurig gebruik van hoge dosis paracetamol zijn beschreven. Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, of een bijwerking die u als ernstig ervaart, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

### **Hoe lang is Witte Kruis houdbaar en hoe moet u het bewaren?**

Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de originele verpakking. Gebruik dit middel niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp" (maand/jaar).

Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

### **Laatste herziening van deze bijsluiter:**

Juli 2004

09/06