

Leidapharm Diarreeremmer

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: De capsules zijn grijs/donkergroen van kleur.

Samenstelling

De werkzame stof is loperamidehydrochloride. Iedere capsule bevat 2 mg loperamidehydrochloride. Als hulpstoffen zijn gebruikt: lactose, maïszetmeel, talk, magnesiumstearaat, gelatine, ijzeroxide (E172), patent blauw (E131), titaandioxide (E171) en zonnegeel (E110).

Verpakkingsvorm

De capsules zijn verkrijgbaar in doordrukstrip- en in flaconverpakkingen.

Hoe werkt Diarreeremmer?

Diarreeremmer is een verbinding die door inwerking op de darmwand werkzaam is tegen diarree.

Inschrijving

De registratiehouder van dit geneesmiddel is Leidapharm BV, Zernikedreef 20, 2333 CL Leiden. Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder: RVG 21760=57788 Diarreeremmer, capsules 2 mg

Voor wie is Diarreeremmer bestemd?

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met plotselinge of langdurige diarree, wanneer behandeling van de oorzaak niet mogelijk is.

Wanneer mag u Diarreeremmer niet gebruiken?

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen.

Deze aandoeningen zijn:

- bepaalde vergiftigingen waarbij verstopping vermeden moet worden;
- bepaalde darmaandoeningen (zoals subileus) waarbij verstopping vermeden moet worden;
- ernstige darmontsteking die gepaard gaat met koorts en/of bloed in de ontlasting;
- plotselinge darmontstekingen door het gebruik van bepaalde antibiotica.
- Bij kinderen jonger dan 8 jaar mag eveneens geen Diarreeremmer toegediend worden.

Diarreeremmer bij zwangerschap en borstvoeding...

Tijdens de zwangerschap moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken. Gebruik van dit geneesmiddel tijdens de periode van borstvoeding wordt ontraden. Wanneer tijdens de periode van borstvoeding toch Diarreeremmer gebruikt moet worden, moet u overgaan op flesvoeding.

Beïnvloedt Diarreeremmer de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Diarreeremmer kan als bijwerking duizeligheid veroorzaken. Hiermee moet u rekening houden bij deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen...

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wanneer uw klachten langer dan 48 uur aanhouden of terugkeren moet u uw arts raadplegen. Bij diarree met bloed en slijm in de ontlasting, al dan niet met koorts, moet de arts worden geraadpleegd. Uitdroging kan speciaal bij jonge kinderen en bejaarden voorkomen. Het is te herkennen aan het optreden van een droge mond, duizeligheid en braken. Bij uitdroging moet direct ORS-zout worden toegediend. ORS bevat een aantal belangrijke zouten en glucose en is verkrijgbaar bij de apotheek. Als de plotseling optredende diarree langer dan 48 uur duurt moet contact worden opgenomen met de arts. Wanneer u Diarreeremmer gebruikt voor langdurige diarree kan de dosering misschien na enige dagen worden verlaagd óf de behandeling kan worden gestopt. Neem hiervoor eerst contact op met uw arts. Patiënten met een slechte werking van de lever zijn gevoeliger voor de eventuele bijwerkingen van Diarreeremmer. Stop met het gebruik en neem contact op met uw arts als u last krijgt van verstopping of een opgezette buik. De capsules zijn niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar.

Aanwijzingen voor het gebruik...

De capsules kunnen het beste in hun geheel worden ingenomen met een ruime hoeveelheid water (half glas).

Verschijnselen en behandeling van overdosering

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: droge mond en maagdarmlaasten zoals misselijkheid, braken, buikpijn en buikkrampen. In ernstige gevallen kunnen onbeweeglijkheid, ademhalingsmoeilijkheden, slaperigheid en afwijkingen in de coördinatie optreden. Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, slaat u deze over of u schuift de doseringen op. (Er moet minimaal 2 uur zitten tussen 2 doseringen).

Dosering

In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

Bij plotseling optredende diarree:

Volwassenen:

begin dosering 2 capsules ineens. Daarna bij aanhouden van dunne ontlasting elke 2 uur 1 capsule, maximaal 8 capsules per dag.

Kinderen vanaf 8 jaar:

begin dosering 1 capsule. Daarna bij aanhouden van dunne ontlasting elke 2 uur 1 capsule, de maximale dosering per dag is afhankelijk van het lichaamsgewicht (3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht).

Bij langdurige diarree:

Volwassenen:

begin dosering 2 capsules ineens. Deze begin dosering moet worden bijgesteld totdat 1 tot 2 vaste ontlastingen per dag worden verkregen. Dit wordt meestal bereikt met 1 tot 6 capsules per dag. Maximaal 8 capsules per dag.

Kinderen vanaf 8 jaar:

begin dosering 1 capsule. Deze begin dosering moet worden bijgesteld totdat 1 tot 2 vaste ontlastingen per dag worden verkregen, hetgeen gewoonlijk wordt bereikt met een onderhoudsdosering van 1 tot 6 capsules per dag. De maximale dosering per dag is afhankelijk van het lichaamsgewicht (3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht).

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Diarreeremmer...

Het gebruik van Diarreeremmer kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:

- buikpijn
- opgezet gevoel in de buik
- verstopping
- misselijkheid
- braken
- duizeligheid
- droge mond en huiduitslag.

Over het algemeen komen deze bijwerkingen bij dit geneesmiddel weinig voor. Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moet Diarreeremmer bewaard worden?

Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar de capsules in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) bij kamertemperatuur (15-25°C).

Hoe lang kan Diarreeremmer bewaard worden?

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de capsules gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). U kunt eventueel niet gebruikte capsules bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

06/98

Code: 6181