

Leidapharm Broomhexine HCl 8 mg

Deze bijsluitertekst bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit geneesmiddel. Lees de tekst daarom altijd van tevoren!

Hoe zien de tabletten er uit?

De tabletten zijn wit en hebben een breukstreep. Op de tabletten staat "Broomhexine 8 mg".

Wat zit er in de tabletten?

De werkzame stof is broomhexinehydrochloride. De tabletten bevatten per tablet 8 mg broomhexinehydrochloride. Als hulpstoffen zijn gebruikt: lactose, maïszetmeel, gelatine, talk en magnesiumstearaat.

Verpakkingsvorm

De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 30 stuks.

Welke werking heeft Broomhexine?

Broomhexine verdunt taai slijm in de luchtwegen. Hierdoor kan het makkelijker worden opgehoest. De werking treedt na enkele uren op, maar de verlichting van de ademhaling en demping van de hoestprikkel is pas na enkele dagen merkbaar.

RVG In het register ingeschreven onder:

RVG 21924=56954 Broomhexine HCl 8 mg, tabletten

Registratiehouder: Leidapharm BV, Zernikedreef 20, 2333 CL Leiden

Waarvoor wordt Broomhexine gebruikt?

Ter vergemakkelijking van het ophoesten, wanneer dit door taai slijm wordt bemoeilijkt zoals bij bepaalde aandoeningen van de luchtwegen (bronchitis, emfyseem, mucoviscidose en bronchiëctasieën).

Wanneer mag Broomhexine niet gebruikt worden?

Als u overgevoelig bent voor broomhexine of voor één van de andere bestanddelen uit de tablet.

Kan Broomhexine tijdens zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt?

Wanneer u zich aan de aanbevolen dosering houdt, kunnen de tabletten tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Broomhexine wordt in de moedermelk uitgescheiden. Hiermee moet u rekening houden bij het geven van borstvoeding.

Heeft Broomhexine invloed op de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Dit geneesmiddel kan als bijwerking duizeligheid veroorzaken. Hiermee moet u rekening houden bij deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines.

Waar moet u op letten als u ook andere geneesmiddelen gebruikt?

Er kan een wisselwerking optreden tussen broomhexine en oxytetracycline (een middel bij bacteriële infecties). Raadpleeg uw arts als u dit middel ook gebruikt.

Waar moet verder op gelet worden?

Als de klachten langer aanhouden dan 14 dagen moet u een arts raadplegen. Patiënten met een bestaande maag-/darmzweer of die een maag-/darmzweer hebben gehad, moeten voorzichtig zijn met het gebruik van dit geneesmiddel.

Hoe moeten de tabletten worden gebruikt?

De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden.

Welke dosering?

- Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 3 x per dag ½ - 2 tabletten.
- Kinderen van 5-10 jaar: 3 x per dag ½ - 1 tablet.

Wat te doen bij overdosering?

Als er teveel is ingenomen, kunnen de in de rubriek "Welke bijwerkingen heeft Broomhexine?" genoemde verschijnselen optreden. Wanneer u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Dosis vergeten?

Als u een dosis vergeten bent in te nemen dan slaat u deze gewoon over.

Welke bijwerkingen heeft Broomhexine?

Transpireren, duizeligheid en maagklachten kunnen optreden. Leverfunctiewaarden kunnen verhoogd worden. Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiters of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe bewaart u dit geneesmiddel het best?

Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen! Bewaar de tabletten op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) bij kamertemperatuur (15-25°C). Bewaar geneesmiddelen zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking.

Hoe lang kan dit geneesmiddel bewaard worden?

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Op de strips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).

09/97 Code: 6356