

Nectadyn[®]H

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Nectadyn H zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Nectadyn H en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Nectadyn H gebruikt.
3. Hoe wordt Nectadyn H gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nectadyn H?
6. Algemene informatie

Nectadyn H

De actieve bestanddelen voor 100 g zijn: Baptisia tinctoria D6, Drosera rotundifolia D4, Hydrastis canadensis D6, Ipecacuanha D4, Rumex crispus D4, Sambucus nigra D4 telkens 1.5 g

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: enkelvoudige siroop, honing.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

-Heel Belgium n.v.

Booiebos 25

9031 Drongen

België

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 93711

1. Wat is Nectadyn H en waarvoor wordt het gebruikt?

Nectadyn H is een homeopathisch geneesmiddel voor gebruik bij hoest. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

Flacon met 125 ml of 250 ml stroop.

2. Wat u moet weten voordat u Nectadyn H gebruikt.

Wanneer mag u Nectadyn H niet gebruiken:

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nectadyn H:

Nectadyn H bevat 7.7 g van een mengsel van sucrose, fructose en glucose per dosis van 10 ml. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

Gebruik van Nectadyn H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Nectadyn H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Nectadyn H gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 5x daags 10 ml.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 5x daags 5 ml.

Kinderen van 2 tot 6 jaar: 5x daags 2.5 ml.

Het is aanbevolen de doseerbeker na ieder gebruik te reinigen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Nectadyn H heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Nectadyn H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Nectadyn H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Nectadyn H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Nectadyn H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Nectadyn H?

Nectadyn H buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C, bewaren in de goed gesloten, originele verpakking

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Nectadyn H niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

Indien bewaard zoals aanbevolen is een éénmaal aangebroken verpakking nog 6 maanden houdbaar.

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 12/2006.