



Prevalin

NATRIUMCROMOGLICAAT 20 mg/ml

OOG
DRUPPELS

TEGEN
VERSCIJNSELEN
VAN HOOIKOORTS

PREVALIN oogdruppels natriumcromoglicaat

Samenstelling

Prevalin oogdruppels bevatten per ml 20 mg natriumcromoglicaat als werkzame stof; dinatriumedetaat, benzalkoniumchloride en gezuiverd water als hulpstoffen.

Productvorm en inhoud verpakking

Oogdruppels, steriel verpakt in een flacon van 10 ml.

Eigenschappen

Prevalin remt het vrijkomen van stoffen die overgevoelighedsreacties kunnen veroorzaken, zodat de verschijnselen van hooikoorts (rode ogen, tranende ogen en jeuk) worden tegengegaan.

Gegevens fabrikant

Chefaro Nederland B.V.,
Postbus 6014,
3002 AA Rotterdam

Inschrijvingsnummer

Prevalin oogdruppels is in het register ingeschreven onder RVG 17237=57336.

Gebruiken bij

Ontstekingen van het bindvlies van het oog tengevolge van een allergische reactie op bepaalde stoffen (bijvoorbeeld stuifmeelkorrels van grassen of planten, huisstofmijt en huidschilfers van dieren).

Niet te gebruiken bij

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het verdient aanbeveling geen zachte contactlenzen te dragen gedurende de behandelingsperiode.

Wisselwerkingen

Er zijn geen gegevens bekend over wisselwerkingen met andere geneesmiddelen of met andere stoffen.

Gebruik tijdens zwangerschap en in de periode van borstvoeding

Raadpleeg voor gebruik eerst uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Er zijn hieromtrent geen gegevens bekend. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Dosering en wijze van gebruik

4 tot 6 maal daags 1 à 2 druppels in ieder oog.
Zolang u bent blootgesteld aan de stoffen waarvoor u overgevoelig bent, is voortzetting van het gebruik van Prevalin aan te bevelen. Wanneer u het gebruik hiervan onderbreekt, kunnen de klachten terugkeren.

Overdoseering

Niet van toepassing.

Bijwerkingen

In enkele gevallen kan branderigheid, zwelling, roodheid of jeuk van het oog of oogleden voorkomen. Bij langdurig gebruik kan benzalkoniumchloride schadelijk zijn voor het oog.
Raadpleeg uw arts indien bij gebruik van de oogdruppels de klachten juist verergeren. Dit kan wijzen op een overgevoeligheidsreactie voor benzalkoniumchloride. Indien u meent last te hebben van een bijwerking die hier niet staat vermeld, gelieve deze dan te melden aan uw arts of apotheker.

Houdbaarheid

Prevalin is houdbaar tot de datum die op de verpakking achter "niet te



gebruiken na" is vermeld. Bij juist gebruik en indien bewaard zoals aanbevolen, is een eenmaal aangebroken flacon nog 4 weken houdbaar. Met het oog op een beter milieu adviseren wij u een niet opgebruikte flacon, waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, ter vernietiging aan uw apotheker of drogist aan te bieden.


Bewaren

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25° C) in de originele verpakking (niet in de koelkast). Prevalin niet blootstellen aan direct zonlicht. Buiten bereik van kinderen houden.

Datum van meest recente herziening
Januari 1997

Vermeld bij correspondentie altijd het chargenummer dat staat vermeld op de bovenzijde van het kartonnen doosje en op het etiket van de flacon.

Gebruiksaanwijzing




1. Schroef het dopje van de flacon.



2. Plaats de wijsvinger van uw hand iets onder het midden van het onderste ooglid. Trek het ooglid voorzichtig omlaag, waardoor een soort zakje ontstaat. Breng het hoofd naar achteren en kijk naar uw wenkbrauw.



3. Neem de flacon tussen duim en wijsvinger van uw andere hand. Breng 1 à 2 druppels in de onderzijde van de buitenste ooghoek, door druk uit te oefenen op de zijkant van de flacon. Vermijd aanraking van de druppelaar teneinde verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.



4. Sluit de flacon na gebruik.