

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Fluumucil 40 mg/ml drank Forte zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Fluumucil 40 mg/ml drank Forte en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Fluumucil 40 mg/ml drank Forte gebruikt.
3. Hoe wordt Fluumucil 40 mg/ml drank Forte gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Fluumucil 40 mg/ml drank Forte?

FLUIMUCIL 40 MG/ML DRANK FORTE

- Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne 40 mg/ml.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), dinatriumedetaat, natriumcarboxymethylcellulose (E466), natriumsaccharine (E954), grenadinesmaak (bevat o.a. propyleenglycol en glyceroltriacetaat (E1518)), aardbeismaak (bevat o.a. propyleenglycol), sorbitol (E420), natriumhydroxide (E524) en gezuiverd water.

Registratiehouder: Zambon Nederland B.V.
Algolweg 9A
3821 BG Amersfoort

In het register ingeschreven onder RVG 29360.

1. Wat is Fluumucil 40 mg/ml drank Forte en waarvoor wordt het gebruikt?

Samenstelling

Fluumucil 40 mg/ml drank Forte bevat 40 mg acetylcysteïne per ml drank. Een maatbeker van 15 ml bevat 600 mg acetylcysteïne. Een maatbeker van 5 ml bevat 200 mg acetylcysteïne.

Hoe werkt Fluumucil 40 mg/ml drank Forte?

Acetylcysteïne is een slijmoplossend middel en breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Acetylcysteïne is bovendien een afgeleide van het natuurlijke aminozuur cysteïne. Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion. Glutathion vangt vrije radicalen weg die weefselbeschadiging kunnen veroorzaken en vrijkomen bij ontstekingsprocessen. Door gebruik van acetylcysteïne kan een tekort aan glutathion worden aangevuld.

Hoe is Fluimucil 40 mg/ml drank Forte verpakt?

Het is verpakt in bruine, glazen flessen van 150 en 200 ml, met polypropyleen afsluiting voorzien van chloorbutylrubber inleg. In de kartonnen doos vindt u ook een (polypropyleen) maatbeker met aanduidingen van 5 ml en 15 ml.

Waarvoor wordt Fluimucil 40 mg/ml drank Forte gebruikt?

Fluimucil wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen om het ophoesten van taai slijm te vergemakkelijken, zoals bij astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem (een longaandoening gepaard gaande met kortademigheid), mucoviscidose (taaislijmziekte) en bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

2. Wat u moet weten voordat u Fluimucil 40 mg/ml drank Forte gebruikt**Gebruik Fluimucil 40 mg/ml drank Forte niet**

- Wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysteïne of één van de hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met Fluimucil 40 mg/ml drank Forte

- Wanneer u een maagzweer heeft, omdat Fluimucil 40 mg/ml drank Forte uw maagwand kan irriteren.
- Omdat Fluimucil 40 mg/ml drank Forte afgeleiden van parahydroxybenzoaten bevat, welke allergische reacties kunnen veroorzaken. Wellicht kunnen deze reacties na enige tijd ontstaan.
- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Wanneer u een natriumbepert dieet volgt, omdat Fluimucil 40 mg/ml drank Forte 6,6 mg natrium per ml drank bevat. De aanbevolen dagdosering levert 99 mg natrium.

Fluimucil 40 mg/ml drank Forte is suikervrij en kan dan ook door diabetes patiënten worden gebruikt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Fluimucil 40 mg/ml drank Forte kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht gebruikt worden door zwangere vrouwen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Fluimucil 40 mg/ml drank Forte kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de zuigeling gebruikt worden gedurende de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteïne op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Fluimucil 40 mg/ml drank Forte met andere geneesmiddelen

Fluimucil 40 mg/ml drank Forte mag voor het innemen niet gemengd worden met antibiotica. Het na elkaar innemen is wel toegestaan.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Fluimucil 40 mg/ml drank Forte gebruikt?

Volwassenen:

Een maatbeker van 15 ml (=600 mg), eenmaal daags.

Kinderen ouder dan 7 jaar:

Een maatbeker van 5 ml (=200 mg), driemaal daags.

Verzwakte patiënten en bejaarden wordt aangeraden om de dosis 's morgens in te nemen.

De fles schudden vóór gebruik. De dosis in de maatbeker gieten en onmiddellijk innemen.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat Fluimucil 40 mg/ml drank Forte te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik dit product niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Fluimucil 40 mg/ml drank Forte heeft gebruikt:

Klachten die kunnen voorkomen als gevolg van de inname van een te grote hoeveelheid zijn: braken.

Wanneer u teveel Fluimucil 40 mg/ml drank Forte heeft gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten uw Fluimucil 40 mg/ml drank Forte te gebruiken:

Wanneer u één of meerdere doseringen vergeten bent, kunnen uw klachten aanhouden of in ernst toenemen. Het is raadzaam om in dat geval uw normale gebruik te continueren. Echter, indien het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem de "vergeten" dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het doseringsschema.

Neem nooit een dubbele dosis Fluimucil 40 mg/ml drank Forte om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Fluimucil 40 mg/ml drank Forte bijwerkingen veroorzaken.

Maagdarmklachten kunnen bij gebruik van Fluimucil 40 mg/ml drank Forte voorkomen. Deze bestaan uit misselijkheid en braken. Bij patiënten die een maagzweer hebben of hebben gehad kan acetylcysteïne een ongunstige werking hebben op het maagslijmvlies.

In geval er bij u een bijwerking optreedt, die niet in deze bijsluiters is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Fluimucil 40 mg/ml drank Forte?

Fluimucil 40 mg/ml drank Forte buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet in de koelkast bewaren of invriezen. Bewaar Fluimucil 40 mg/ml drank Forte in de originele verpakking.

Na het openen van de flacon is de drank 15 dagen houdbaar, mits niet bewaard boven de 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Fluimucil 40 mg/ml drank Forte niet meer na de datum die op de verpakking vermeld staat achter "Niet gebruiken na" of "exp", maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in januari 2005.