



Noscapect®

Wat u moet weten over ROTER Noscapect®

In deze bijsluiters leest u hoe u ROTER Noscapect® veilig kunt gebruiken met het beste resultaat. ROTER en Noscapect® zijn geregistreerde handelsmerken van Imgroma B.V., Postbus 694, 6200 AR Maastricht. In het register ingeschreven onder RVG 02256.

Samenstelling

ROTER Noscapect® bevat per dragee 15mg noscaphinehydrochloride. Om de dragee te kunnen maken zijn de volgende hulpstoffen gebruikt: lactose, maïszetmeel, snowflake, talk, magnesiumstearaat, saccharose, natriumdihydrogenfosfaat, dinatriumwaterstoffosfaat, colloïdaal siliciumoxide, calciumcarbonaat (licht), carboxymethylcellulose-natrium, polyethyleenglycol 6000, natriumdocusaat, natriumbenzoaat, methylparahydroxybenzoaat, glucoseroep, polyvidon, cera alba, schellak, carnaubawas, indigocarmijn (E132) en titaandioxide (E171).

Verpakking

ROTER Noscapect® dragees zijn verkrijgbaar in doosjes van 20 stuks.

Hoe werkt ROTER Noscapect®?

ROTER Noscapect® bevat noscaphine. Noscaphine is een hoestprikkeldeempende stof; het aangrijpingspunt voor de werking ligt in het centrale zenuwstelsel.

ROTER Noscapect® wordt gebruikt bij:

Prikkelhoest of droge hoest.

Wanneer mag u ROTER Noscapect® niet gebruiken?

Gebruik ROTER Noscapect® niet als u overgevoelig bent voor noscaphine of voor andere bestanddelen van de dragee.

Waar moet u op letten als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft?

U kunt voor zover bekend ROTER Noscapect® zonder gevaar voor het ongeboren kind of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift gebruiken tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. Wel wordt noscaphine in geringe mate in de moedermelk uitgescheiden. Overleg bij twijfel met uw arts.

Wat is de invloed van ROTER Noscapect® op de rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen?

Mocht u last krijgen van lichte sufheid of duizeligheid na het gebruik van ROTER Noscapect® dan wordt u afgeraden om een motorrijtuig te besturen of mogelijk gevaarlijke en oplettenheid vereisende handelingen te verrichten.

Kunt u tegelijkertijd andere geneesmiddelen gebruiken?

Als u ROTER Noscapect® gebruikt volgens het voorschrift in deze bijsluiters zijn wisselwerkingen met andere middelen niet te verwachten.

Waar moet u op letten als u ROTER Noscapect® gaat gebruiken?

Het wordt ontraden ROTER Noscapect® langdurig of veelvuldig te gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert. Indien uw klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, doet u er verstandig aan uw arts te raadplegen.

Hoe gebruikt u ROTER Noscapect®?

Volwassenen: 3 tot 4 keer per dag 1 of 2 dragees
Kinderen van 6 jaar en ouder: 3 tot 4 keer per dag 1 dragee
Kinderen beneden 6 jaar: alleen op voorschrift van de arts

Verstrijk de dragees waarop u ROTER Noscapect® inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag en in ieder geval met tussenpozen van tenminste 4 uur. De dragees in hun geheel doorslikken, desnoods met wat water. Niet stukbijten, omdat anders de bittere smaak van het geneesmiddel vrijkomt.

Wat moet u doen als er teveel ROTER Noscapect® is ingenomen?

Na het innemen van teveel ROTER Noscapect® kunnen bijwerkingen in versterkte mate optreden. Waarschuw direct een arts en probeer indien mogelijk de patiënt te laten braken.

Welke bijwerkingen heeft ROTER Noscapect®?

Elk geneesmiddel kan soms ongewenste effecten hebben: zogenaamde bijwerkingen. De hierna vermelde bijwerkingen kunnen voorkomen. Waarschuw uw arts of apotheker indien u meent last te hebben van een bijwerking die hieronder niet vermeld wordt.

ROTER Noscapect® dragees kunnen bij sommige personen overgevoelighedsreacties teweegbrengen zoals huiduitslag, irritatie van het oog of de neusholte of plotselinge pijn in buik en borst. Incidenteel kunnen lichte sufheid, duizeligheid en misselijkheid voorkomen.

Hoe bewaart u ROTER Noscapect®?

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen!
Bewaar ROTER Noscapect® in de originele verpakking op een droge plaats en bij kamertemperatuur (15-25°C). ROTER Noscapect® blijft zo houdbaar tot de datum op de verpakking. De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op het doosje onder 'Niet te gebruiken na:' en op de stip naast de letters 'exp'. Gebruik ROTER Noscapect® niet na deze datum.

Deze tekst is herzien en goedgekeurd in

juli 2000