

Leidapharm Kinderparacetamol 120 mg

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: De kauwtabletten zijn wit, rond, plat en hebben aan één kant een breukstreep.

Verpakkingsvorm

De kauwtabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakking van 20 stuks.

Samenstelling

De werkzame stof is paracetamol. Iedere kauwtablet bevat 120 mg paracetamol. Als hulpstoffen zijn gebruikt: lactose, ethylcellulose, mannitol, saccharinenatrium, pepermuntolie en magnesiumstearaat.

Hoe werkt Kinderparacetamol?

Paracetamol behoort tot de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende middelen.

Inschrijving

De registratiehouder van dit geneesmiddel is
Leidapharm BV, Zernikedreef 20, 2333 CL Leiden.

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 21952=19255 Kinderparacetamol 120 mg, kauwtabletten

Voor wie is Kinderparacetamol bestemd?

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met:

- hoofdpijn
- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na vaccinatie
- kiespijn
- zenuwpijn
- spierpijn

Wanneer mag u Kinderparacetamol niet gebruiken...

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn: overgevoeligheid voor paracetamol of één van de andere bestanddelen uit de kauwtablet.

Kinderparacetamol bij zwangerschap en borstvoeding...

Deze rubriek is niet van toepassing aangezien Kinderparacetamol bestemd is voor kinderen tot 9 jaar.

Beïnvloedt Kinderparacetamol de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Voor zover bekend heeft het geneesmiddel hierop geen ongunstige invloed.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen...

Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Middelen waarvan bekend is, dat zij de werking van paracetamol kunnen beïnvloeden of waarvan paracetamol de werking kan beïnvloeden, zijn:

- chlooramfenicol (middel bij bepaalde infecties) en zidovudine (middel bij de behandeling van AIDS)
- sommige slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten): bij langdurig gebruik kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering met paracetamol.

Waarschuwingen en voorzorgen...

Wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren, moet u uw arts raadplegen. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. U moet voorzichtig zijn, wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.

Aanwijzingen voor het gebruik...

De kauwtabletten zijn vooral bedoeld voor toediening aan kinderen. De paracetamol is speciaal behandeld om de nare smaak van de paracetamol zoveel mogelijk tegen te gaan; de tabletten moeten worden opgekauwd of fijngemaakt en met water of limonade worden ingenomen. Het toedieningsinterval moet minstens 4 uur bedragen. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijdscategorie. Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan. Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden.

Dosering

In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

- Kinderen van 3-12 maanden (5,5-10 kg): een halve ($\frac{1}{2}$) kauwtablet 4 tot 6 maal per dag.
- Kinderen van 1-2 jaar (10-12,5 kg): één kauwtablet 4 tot 6 maal per dag.
- Kinderen van 2-4 jaar (12,5-17 kg): één tot anderhalve ($1\frac{1}{2}$) kauwtablet 4 tot 6 maal per dag.
- Kinderen van 4-6 jaar (17-22 kg): anderhalve ($1\frac{1}{2}$) kauwtablet 4 tot 6 maal per dag.
- Kinderen van 6 tot 9 jaar: twee kauwtabletten 4 tot 6 maal per dag.

Verschijnselen en behandeling van overdosering

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: verlies van eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. Bij te laat handelen, kan ernstige schade aan de lever optreden.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Kinderparacetamol

Het gebruik van Kinderparacetamol kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: overgevoeligheid, zoals huiduitslag, galbulten en koorts. Wanneer langdurig hoge doseringen worden gebruikt (3-4 gram per dag) kan leverbeschadiging optreden. Wanneer bij u een bijwerking optreedt, die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moet Kinderparacetamol bewaard worden

Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar de kauwtabletten in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) bij kamertemperatuur (15-25°C).

Hoe lang kan Kinderparacetamol bewaard worden

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de kauwtabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). U kunt eventueel niet gebruikte kauwtabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

05/99 Code: 6353