

Leidapharm Laxeerdragees

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: De tabletten zijn geel, rond en bol.

Samenstelling

De werkzame stof is bisacodyl. Iedere tablet bevat 5 mg bisacodyl. Als hulpstoffen zijn gebruikt: lactose, maïszetmeel, gelatine, magnesiumstearaat, methacrylzure copolymeer, talk, natriumhydroxide, triethylcitraat, sucrose, acacia, titaandioxide (E171), calciumcarbonaat, gehydrogeneerde castorolie, chinolinegeel (E104), zonnegeel (E110), povidon, natriumbenzoaat, indigokarmijn (E132), schellak, witte bijenwas, carnaubawas.

Verpakking

De maagsapresistente tabletten zijn verkrijgbaar in een doordrukstripverpakking van 30 stuks.

Hoe werkt bisacodyl

Bisacodyl behoort tot de groep van de zogenaamde laxantia (middelen tegen verstopping). Het bevordert door contact met het darmslijmvlies de stoelgang. Na ongeveer 6 tot 12 uur geeft bisacodyl een zachte ontlasting.

Inschrijving

De registratiehouder van dit geneesmiddel is
Leidapharm BV, Zernikedreef 20, 2223 CL Leiden.

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 21904=52273 Laxeerdragees, maagsapresistente tabletten 5 mg.

Voor wie zijn Laxeerdragees bestemd?

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met langdurige of steeds terugkerende verstopping. Onder medisch toezicht kan het ook worden toegepast als voorbereiding voor bepaalde ingrepen of operaties.

Wanneer mag u Laxeerdragees niet gebruiken?

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen, zoals:

- Overgevoeligheid voor bisacodyl of andere bestanddelen van de tablet;
- plotselinge buikpijn of een versperring in de darmen, waarvan de oorzaak niet bekend is;
- verschijnselen van een blindedarmonsteking;
- ernstige uitdrogingsverschijnselen

Laxeerdragees bij zwangerschap en borstvoeding...

Er zijn geen aanwijzingen dat bisacodyl ongewenste of schadelijke effecten heeft bij gebruik tijdens de zwangerschap. Aangeraden wordt om bisacodyl tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na overleg met uw arts. Het gebruik van bisacodyl tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.

Beïnvloeden Laxeerdragees de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Hierop heeft bisacodyl voor zover bekend geen invloed.

Gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen...

Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Bij overmatig gebruik van bisacodyl kan gelijktijdig gebruik met plasmiddelen (diuretica) of bepaalde middelen die gebruikt worden bij aandoeningen van de bijnierschors (adreno-corticosteroiden) leiden tot een verstoring van de zoutbalans. Dit kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor hartglycosiden (digoxine).

Waarschuwingen en voorzorgen...

U dient de aangegeven doseringen niet te overschrijden.

Wanneer uw klachten langer dan 3 dagen aanhouden of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen. Zoals alle laxemiddelen, mag bisacodyl niet gedurende een langere periode dagelijks gebruikt worden, zonder dat de oorzaak van de verstopping is vastgesteld. Langdurig gebruik kan leiden tot een verstoring van de zoutbalans en een tekort aan kalium. Dit kan weer opnieuw tot verstopping leiden. Kinderen mogen bisacodyl alleen gebruiken na overleg met de arts.

Aanwijzingen voor gebruik...

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (half glas) 's avonds ingenomen worden. De tabletten dienen zonder te kauwen ingenomen te worden. Niet gelijktijdig innemen met melk of middelen tegen teveel maagzuur.

Dosering

De gebruikelijke dosering is:

- Bij verstopping:
- voor volwassenen en kinderen boven 10 jaar, 's avonds 1 tot 2 tabletten (5-10 mg).
- voor kinderen van 4 tot 10 jaar, 's avonds 1 tablet (5 mg)
- Als voorbereiding voor ingrepen of operaties: voor volwassenen en kinderen boven 10 jaar; 2 tot 4 tabletten op de avond vóór de ingreep. Op de morgen waarop de ingreep plaatsvindt wordt een zepil met 10 mg bisacodyl gegeven.
- voor kinderen van 4 tot 10 jaar; 1 tablet op de avond vóór de ingreep. Op de morgen waarop de ingreep plaatsvindt wordt een zepil met 5 mg bisacodyl gegeven.

Verschijnselen en behandeling van overdosering...

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: waterige ontlasting (diarree), buikkrampen en verstoring van de zoutbalans. Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als u vergeten bent een dosering in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, kunt u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter de vergeten dosering overslaan.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van bisacodyl...

Het gebruik van bisacodyl kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: In zeldzame gevallen zijn lichte buikkrampen en diarree gemeld. In zeer zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden, waaronder ook angio-oedeem (plaatselijke, snelle ophoping van vocht in het gelaat rondom de mond (vooral van lippen, keel en tong)). Duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden, meestal tegelijk met het verliezen van ontlasting. Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moeten Laxeerdragees bewaard worden?

Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) beneden 25°C.

Hoe lang kunnen Laxeerdragees bewaard worden?

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (=niet te gebruiken na).

04/02 Code: 6351