

Leidapharm anti-worm tabletten

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: De tabletten zijn wit, rond, hebben een breukstreep en de inscripties "Mebendazol" en "100".

Samenstelling

De werkzame stof is mebendazol. Iedere tablet bevat 100 mg mebendazol. Als hulpstoffen zijn gebruikt: maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, gelatine, glycerol, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, sacharinenatrium, crosspovidon, colloïdaal siliciumoxide en magnesiumstearaat.

Verpakking

De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakking van 2 stuks.

Hoe werken de Leidapharm anti-worm tabletten

Mebendazol behoort tot de groep van de zogenaamde anthelmintica (= wormdodende middelen). Het is werkzaam tegen de meeste in Nederland voorkomende wormsoorten.

Inschrijving

De registratiehouder van dit geneesmiddel is Leidapharm BV, Zernikedreef 20, 2333 CL Leiden. Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder: RVG 21941=19111 anti-worm tabletten, tabletten 100 mg

Voor wie zijn de Leidapharm anti-worm tabletten bestemd?

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met worminfecties die veroorzaakt worden door aarsmaden, spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en lintwormen.

Wanneer mag u de Leidapharm anti-worm tabletten niet gebruiken?

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn: overgevoeligheid voor mebendazol of één van de andere bestanddelen uit de tablet.

Leidapharm anti-worm tabletten bij zwangerschap en borstvoeding...

Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.

Beïnvloeden de Leidapharm anti-worm tabletten de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Voor zover bekend heeft het geneesmiddel hierop geen ongunstige invloed.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen:

Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Een medicijn waarvan bekend is dat het de werking van de anti-worm tabletten kan beïnvloeden of waarvan de anti-worm tabletten de werking kunnen beïnvloeden, is cimetidine. Deze wisselwerking komt vooral voor bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen. Bij lage doseringen is er van wisselwerking geen sprake.

Waarschuwingen en voorzorgen:

Er is weinig ervaring met het gebruik van anti-worm tabletten bij kinderen jonger dan 2 jaar. Er hoeft geen speciaal dieet of laxermiddel te worden voorgeschreven. Wanneer de worminfectie gepaard gaat met diarree, moet de diarree tegelijkertijd ook behandeld worden. Glycerol is schadelijk in hoge doses. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.

Aanwijzingen voor het gebruik:

Het gebruik van de anti-worm tabletten bij kinderen onder de 2 jaar wordt afgeraden, tenzij de voordelen opwegen tegen de risico's. Er zijn onvoldoende gegevens over de benodigde dosisaanpassingen in deze leeftijdsgroep (zie ook de rubriek "Mogelijke bijwerkingen ..."). De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) worden ingenomen.

Dosering:

In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat (deze dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen):

Infecties met aarsmaden:

1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet; zo nodig iedere 14 dagen herhalen.

Infecties met spoelwormen, mijnwormen en zweepwormen:

1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen. Als er na 3 weken geen volledige genezing is verkregen, moet de behandeling worden herhaald.

Infecties met lintwormen:

Tweemaal per dag 3 tabletten gedurende 3 dagen.

Verschijnselen en behandeling van overdosering

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: hoofdpijn, duizeligheid en maag- en darmklachten, zoals misselijkheid en braken. Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer u meerdere doses achter elkaar vergeten bent in te nemen, heeft de kuur geen zin meer.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van de Leidapharm anti-worm tabletten:

Het gebruik van anti-worm tabletten kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:

- maag- en darmklachten, zoals misselijkheid en diarree; deze kunnen ook het gevolg zijn van de worminfectie zelf.

Ook kan voorkomen:

- koorts,
 - schilferachtige huidontsteking
 - en stuipen bij zuigelingen
- (zie ook de rubrieken "Aanwijzingen voor het gebruik" en "Dosering").

Zelden komen voor:

- huiduitslag,
- netelroos,
- een opgezette keel
- en opgezette gewrichten.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt, die niet vermeld wordt in de bijsluiters of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moeten de Leidapharm anti-worm tabletten bewaard worden?

Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een droge plaats (badkamer en keuken zijn dus ongeschikt) bij 15-25°C.

Hoe lang kunnen de Leidapharm anti-worm tabletten bewaard worden?

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

02/03

Code: 6487