

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Otagan zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Otagan en waarvoor wordt het gebruikt?
 2. Wat u moet weten voordat u Otagan gebruikt.
 3. Hoe wordt Otagan gebruikt?
 4. Mogelijke bijwerkingen.
 5. Hoe bewaart u Otagan?
-

OTALGAN[®] oordruppels, oplossing 5 mg/g
Lidocainehydrochloride

- Het werkzame bestanddeel van Otagan, oordruppels, is lidocainehydrochloride, 5 mg/g.
- Het andere bestanddeel (hulpstof) is glycerol.

1. Wat is Otagan en waarvoor wordt het gebruikt?

Naam van het geneesmiddel

Otagan, oordruppels

Samenstelling

Otagan oordruppels bevatten als werkzaam bestanddeel lidocainehydrochloride, 5 mg/g, en glycerol als hulpstof. 1 ml omvat ongeveer 28 druppels; per ml bevat Otagan 6,3 mg lidocainehydrochloride.

Farmaceutische vorm en inhoud

Oordruppels (oplossing). 1 flacon bevat 12 gram oplossing.

Geneesmiddelengroep

Lidocainehydrochloride is een lokaal werkend pijnstillend middel.

Waarvoor wordt Otagan gebruikt?

Otagan wordt gebruikt bij oorpijn.

2. Wat u moet weten voordat u Otagan gebruikt.

Gebruik Otagan niet wanneer u een loopoor of trommelvliesperforatie heeft of heeft gehad, of overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met Otagan indien er koorts optreedt, of de behandeling niet binnen 2 weken tot resultaat leidt: raadpleeg u dan uw arts.

Zwangerschap

Otagan kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker eventueel om advies voordat u Otagan gebruikt.

Borstvoeding

Bij gebruik van Otagan volgens voorschrift tijdens het geven van borstvoeding is er geen risico aanwezig voor het kind. Vraag uw arts of apotheker eventueel om advies voordat u Otagan gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat het gebruik van Otagan volgens het voorschrift een effect heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Otagan in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn van Otagan geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt Otagan gebruikt?

Naar gelang de leeftijd ca. 3–5 druppels in de gehoorgang brengen met tussenpozen van 2–4 uur. Breng vóór toediening het middel op lichaamstemperatuur.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Otagan bijwerkingen veroorzaken.

Bij het gebruik van Otagan kunnen soms overgevoeligheidsreacties optreden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Otagan?

Otagan buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet boven 25°C bewaren in de originele omverpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Otagan niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter "niet te gebruiken na". Na openen is Otagan nog 1 jaar houdbaar.

Registratiehouder:

Vifor France SA, 123, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret, Frankrijk.

In het register ingeschreven onder RVG 00334.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in April 2006.

Voor meer informatie:

bel Vemedia B.V. 0900 2333 666 (€ 0,15/min.)